

## טבלת השוואה בין תכשירי ברזל הרשומים בישראל\*

פומי, סירופ				פומי, טבליות							תוך-וריד				דרך מתן
Ferripel-3 syrup	Iron Care	Tiptipot Ferripel-3	Ferro 15	Ferrocal	Tardyferon	Folex	Forol	Foric pregnancy	Ferrifol	Foliron	Ferrlecit	Ferinject	Ferrovin	Venofer	שם מסחרי
Iron (as Iron III Hydroxide Polymaltose Complex)	Iron sucrose (as Iron III Hydroxide Sucrose Complex)	Iron (as Iron III Hydroxide Polymaltose Complex)	Ferrous gluconate	Ferrous citrate	Ferrous sulfate	Ferrous fumarate	Ferrous fumarate	Ferrous fumarate	Iron (as Iron III Hydroxide Polymaltose Complex)	Iron sucrose (as Iron III Hydroxide Sucrose Complex)	Iron (as sodium ferric gluconate complex)	Iron (as ferric carboxymaltose)	Iron sucrose (as Iron III Hydroxide Sucrose Complex)	Iron sucrose (as Iron III Hydroxide Sucrose Complex)	סוג הברזל
				קלציום ציטראט 249 מ"ג		חומצה פולית 0.4 מ"ג	חומצה פולית 0.4 מ"ג	חומצה פולית 0.4 מ"ג	חומצה פולית 0.4 מ"ג	חומצה פולית 0.4 מ"ג					חומרים פעילים נוספים
50 מ"ג/ג 5 מ"ל	50 מ"ג/ג 5 מ"ל	50 מ"ג/ג 5 מ"ל	130 מ"ג/ג 5 מ"ל (שווה-ערך ל-15 מ"ג של Fe <sup>++</sup> )	246 מ"ג	247.25 מ"ג ברזל סולפאט = כ-80 מ"ג ברזל	100 מ"ג	100 מ"ג	100 מ"ג	100 מ"ג	100 מ"ג	62.5 מ"ג/ג 5 מ"ל	1,800 מ"ג/ג 10 מ"ל (שווה ערך ל-500 מ"ג ברזל)	100 מ"ג/ג 5 מ"ל	100 מ"ג/ג 5 מ"ל	מינון ברזל
סירופ	סירופ	טיפות לבליעה	סירופ	טבליות	טבליות	טבליות	טבליות	טבליות	טבליות	טבליות	תמיסה להזרקה	תמיסה להזרקה	תמיסה להזרקה	תמיסה להזרקה	צורת מתן
<ul style="list-style-type: none"> <li>ניתן לערבב עם מיצי פירות וירקות או מזון תינוקות</li> <li>יש ליטול במהלך או מיד לאחר הארוחה</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ניתן לערבב עם מיצי פירות וירקות או מזון תינוקות</li> <li>יש ליטול במהלך או מיד לאחר הארוחה</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ניתן לערבב עם מיצי פירות וירקות או מזון תינוקות</li> <li>יש ליטול במהלך או מיד לאחר הארוחה</li> </ul>	מומלץ ליטול על קיבה ריקה, אלא אם ישנן תופעות לוואי במערכת העיכול	<ul style="list-style-type: none"> <li>ניתן לחצות/לכתוש</li> <li>ניתן ליטול עם מים או מיץ פירות</li> <li>מומלץ ליטול על קיבה ריקה, אלא אם ישנן תופעות לוואי במערכת העיכול</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>אין לכתוש/לחצות/ללעוס</li> <li>יש ליטול במהלך או מיד לאחר ארוחה</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>יש ליטול שעה לפני הארוחה או שעתיים לאחריה</li> <li>אם ישנן תופעות לוואי במערכת העיכול, יש ליטול עם הארוחה</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ניתן לכתוש</li> <li>יש ליטול לאחר הארוחה</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ניתן לחצות/לכתוש</li> <li>יש ליטול לאחר הארוחה</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ניתן ללעיסה</li> <li>יש ליטול במהלך או מיד לאחר הארוחה</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ניתן ללעיסה</li> <li>יש ליטול במהלך או מיד לאחר הארוחה</li> </ul>					הנחיות מיוחדות (כתישה / נטילה ביחס למזון)
סוכרוז (1,000 מ"ג ב-5 מ"ל), סורביטול 70% (2,000 מ"ג ב-5 מ"ל), אתנול 96% (15.6 מ"ג ב-5 מ"ל), מתילהידרוקסיבנזואט, פרופילהידרוקסיבנזואט	סוכרוז (2,500 מ"ג ב-5 מ"ל), סורביטול 70% (750 מ"ג ב-5 מ"ל), מתילהידרוקסיבנזואט, פרופילהידרוקסיבנזואט	סוכרוז, סודיום מתילהידרוקסיבנזואט, סודיום פרופילהידרוקסיבנזואט	דקסטרוז (500 מ"ג ב-5 מ"ל), סוכרוז (2,500 מ"ג ב-5 מ"ל), מתילפאראבן ופרופילפאראבן	לקטוז (39.39 מ"ג בטבליה)		לקטוז	לקטוז (כ-75 מ"ג בטבליה)	לקטוז	אספרטיים (1.5 מ"ג בטבליה)	מניטול (368 מ"ג בטבליה)	בנזיל אלכוהול (45 מ"ג ב-5 מ"ל), סוכרוז (975 מ"ג ב-5 מ"ל)				מרכיבים בלתי-פעילים חשובים
12/2020	6/2019	12/2020	7/2014	11/2014		1/2010	10/2015		12/2020	1/2019	8/2020		11/2020	12/2020	תאריך עדכון עלון באתר משרד הבריאות

\* כל המידע בטבלה זו לקוח מעלוני התכשירים כפי שמופיעים במאגר התרופות של משרד הבריאות; תכשירים ללא עלון זמין בעת הבדיקה לא נכללו בטבלה (למשל: Tiptipot Ferripel + D, Hemafer). תאריכי העדכון של העלון של כל תכשיר מצויינים בשורה האחרונה של הטבלה.